

سهیلا پیران، کارشناس  
مسئول برنامه کودکان  
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

# تراژدی مرگ کودک

عمیق تحت درمان قرار می‌گیرد. در طول این مدت یک بار تحت عمل جراحی قرار گرفته ولی با وجود توصیه پزشکان مبنی بر بستری بیمار تا بهبودی کامل و انجام جراحی‌های لازم، والدین بارضایت شخصی کودک را مرخص کرده و به منزل می‌برند. در تمام طول مدت بستری در بیمارستان و نیز در منزل نشانه‌هایی به صورت تب و لرز و استفراغ‌های مکرر وجود داشته است، تا این که حدود ۳ روز قبل از فوت این نشانه‌ها شدیدتر شده و پزشک بر بالین بیمار می‌آوردند. در این زمان کودک بی‌قراری و بی‌خوابی نیز داشته است. پزشک دارو تجویز کرده ولی با وجود مصرف داروها کودک دچار خواب آلودگی و کاهش هوشیاری شده و فوت می‌کند!

۱. اگر در اولین مراجعه به بیمارستان تشخیص نهایی داده می‌شد، کودک در مدت ۳ روز بستری رو به بهبودی نمی‌رفت؟

۲. اگر در موقع ترخیص با رضایت شخصی مشاوره مؤثر انجام می‌گرفت، از بروز این مرگ جلوگیری می‌شد؟

کودک دختر، حاصل دومین حاملگی و دومین زایمان از مادر ۲۳ ساله بود که به شکل کامل و مرتب مراقبت‌های بهداشتی را تا سن ۴ سالگی دریافت کرده و آموزش پیشگیری از سوانح و حوادث نیز به والدین کودک داده شده است.

یک‌ماه قبل از فوت، کودک در منزل مادر بزرگش هنگام بازی با چراغ نفتی دچار سوختگی می‌شود. مادر بزرگ آتش را خاموش کرده و کودک را به مرکز بهداشتی درمانی منتقل می‌کند. آن‌ها نیز جهت کودک رگ‌گیری انجام داده، سرم وصل می‌کنند. والدین کودک رابه منزل منتقل کرده و با درمان سنتی با استفاده از زرده تخم مرغ و کره و روغن کرچک زخم‌ها را پانسمان می‌کنند و بعد به بیمارستان می‌برند که در این فاصله و تا رسیدن به بیمارستان هم‌چنان کودک استفراغ می‌کرده است.

در بیمارستان برای کودک بلافاصله شست‌شوی زخم انجام شده و پس از پانسمان دارو درمانی شروع شده و مدت ۳ روز در بیمارستان بستری می‌شود. سپس با تشخیص سوختگی داخلی با آمبولانس به بیمارستانی در تبریز منتقل شده و به مدت ۲۳ روز در تبریز بستری می‌شود. در معاینات و آزمایش‌ها و عکس‌ها، سوختگی داخلی (امعاء احشاء) تایید نشده ولی به علت سوختگی



به این موضوع امتیاز دهید (۱ تا ۱۰۰)  
نحوه امتیازدهی:  
کد این موضوع ۹۰۲۱۹  
مثال: اگر امتیاز شما ۸۰ باشد: ۸۰ - ۹۰۱  
SMS ۳۰۰۰۷۲۷۳۰۱۰۰۰۱