

## سناریوی مرگ مادر باردار

# طعمه کرونا

متوفا، خانمی ۳۹ ساله، حاملگی ششم، بارداری ناخواسته با BMI 20.03 و LMP: 98.6.27 و EDC:99.4.3 ساکن روستایی از توابع شهرستان زیرکوه بر اساس چک لیست پایش برنامه باروری سالم، مشاوره باروری سالم غیر پزشک به مادر ارایه شده است. سابقه بیماری نداشته و از آنجا که قصد بارداری نیز نداشته، آموزش در خصوص روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری به وی داده شده و در نهایت مادر طی مشاوره اظهار می‌کند که با وجود داشتن ۵ فرزند، قصد بارداری ندارد. بنابراین روش (غیر ایمن) طبیعی را انتخاب کرده است.

### خدمات ارایه شده به وی توسط بهورز خانه بهداشت شامل موارد

#### زیر است:

- مراقبت و شرح حال اولیه غیر پزشک
- ایمن سازی تکمیل شده است
- غربالگری تغذیه
- غربالگری سلامت روان: منفی
- مراقبت هفته ۶ تا ۱۰ غیر پزشک
- مراقبت دوم ۱۶ تا ۲۰ غیر پزشک

### توسط ماما و پزشک نیز این خدمات به مادر ارایه شده است:

- مراقبت و شرح حال اولیه بارداری ماما
  - ملاقات هفته ۶ تا ۱۰ توسط ماما
  - مراقبت ویژه به علت سردرد توسط ماما
  - غربالگری ناهنجاری جنین ۱۱ تا ۱۳ هفته انجام و کم خطر ثبت شده است.
  - ثبت آزمایش‌های معمول نوبت اول
  - مراقبت دوم بارداری هفته ۱۶ تا ۲۰ توسط ماما
  - مراقبت سوم بارداری هفته ۲۴ تا ۳۰ توسط ماما
  - ویزیت پزشک و مراقبت و ثبت شرح حال اولیه
- در مراقبت‌های فوق مادر مشکل خاصی نداشته و در یک جلسه کلاس آمادگی زایمان شرکت کرده است. طبق اظهارات همسر متوفا، وی سه روز قبل از بدحال شدن در منزل تب داشته است ولی به علت ترس از ابتلا به کرونا و شناسایی وی به عنوان بیمار کرونایی و احتمال

#### فریبا قزاقی

کارشناس برنامه مادران  
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند





قرنطینه شدن در منزل، با وجود اصرارهای همسرش راضی به مراجعه به خانه بهداشت یا اطلاع‌رسانی به بهورز نشده است. همچنین همسر وی اظهار داشته که متوفا نگران بوده است که در صورت بستری شدن یا قرنطینه ۵ فرزندش را چه کسی مراقبت کند. به همین دلیل وضعیتش را به بهورز یا ماما اطلاع نداده‌اند و از مواد مخدر برای کنترل تب استفاده کرده‌اند! یک روز قبل از فوت، مادر حین رفتن به دستشویی ناگهان از حال رفته و زمین می‌خورد که همسرش با اورژانس تماس گرفته و بیمار به بیمارستان شهرستان زیرکوه منتقل می‌شود.

- غربالگری کووید ۱۹ برای مادر انجام نشده است. (غربالگری خانوار انجام شده ولی غربالگری فردی توسط ماما یا بهورز انجام نشده است)

#### مداخلات

- پایش پرونده‌های الکترونیک مادران مراکز و پایگاه‌های خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت با تاکید بر ارزیابی ترومبوآمبولی و ارجاعات و پیگیری‌های بموقع بر اساس بوکلت
- حساس سازی کارکنان بهداشتی در رابطه با اهمیت اقدام براساس بوکلت و دقت در ثبت سامانه سیب
- حساس سازی کارکنان در رابطه با آموزش علایم خطر به یک نفر از بستگان مادر نیازمند مراقبت ویژه یا مادر باردار مشکوک به کووید ۱۹
- حساس سازی کارکنان در رابطه با آموزش علایم خطر به مادران نیازمند مراقبت ویژه یا مادران باردار مشکوک به کووید ۱۹
- حساس سازی کارکنان بهداشتی در خصوص انجام غربالگری کووید ۱۹ برای همه مادران باردار تحت پوشش، در ابتدای هر نوبت غربالگری

بیمار با دستور کنترل علایم حیاتی، اکسیژن تراپی با ماسک و مانیتورینگ قلبی ریوی به بیمارستان شهدای قاین اعزام می‌شود. در بیمارستان قاین با CT مشکوک به کرونا و با تشخیص سندرم هلپ به بیمارستان سطح سه (ولی عصر بیرجند) اعزام می‌شود. تیم مشورت گروهی تشکیل شده و تصمیم به ختم بارداری گرفته و پس از انجام ختم بارداری، مادر به ICU منتقل می‌شود اما متأسفانه ساعت ۶ صبح تاریخ ۹۹/۱/۷ فوت می‌کند. تست کرونای متوفا نیز مثبت گزارش می‌شود.

#### قصورات مشاهده شده در پرونده الکترونیک فوق به این شرح است:

- بررسی ارزیابی خطر ترومبوآمبولی با توجه به سن بالای ۳۵ سال مادر و بارداری پنجم و بالاتر توسط ماما انجام نشده است.
- با وجود سن بالای ۳۵ سال مادر، ماما او را به متخصص زنان ارجاع نداده است.
- بررسی همسر از نظر ابتلا به تالاسمی توسط ماما انجام نشده است.
- پیگیری انجام شده توسط ماما در سامانه سیب ثبت نشده است.

به این موضوع امتیازدهید (۱۰۰ تا ۱۰۰). کد موضوع ۱۰۸۲۶ پیامک ۳۰۰۰۷۲۷۳۱۰۰۱. نحوه امتیازدهی: امتیاز- شماره مقاله. مثال: اگر امتیاز شما ۸۰ باشد (۱۰۸۲۶ - ۸۰)